

Projeto 019/13 - Loção Symfit - FCE 2013

Sugestão de Formulação

Nome Comercial	INCI Name	Descrição	%
Fase A			
1. Água deionizada	Aqua	Veículo	Qsp 100
2. Ipegel 940	Carbomer	Carbômero	0,200
3. Veegum Ultra	Magnesium Aluminum Silicate	Agente suspensor e modificador de reologia e tixotropia	1,000
Fase B			
1. Dracolin GOC (683541)	Glyceryl Oleate Citrate, Capryli/Capric Triglyceride	Emulsionante O/A	3,000
2. Óleo de Amêndoa Doce	Prunus Amygdalus Dulcis Oil	Emoliente	1,500
3. Isodragol (660061)	Triisononanoil	Emoliente	1,000
4. Dragoxat 89 (109854)	Ethylhexyl Isononanoate	Emoliente de toque seco	2,500
5. Belsil DM 0,65	Disiloxane	Silicone de alta volatilidade	2,000
6. EDTA Na2	Dissodium EDTA	Sequestrante	0,100
Fase C			
1. Symfit 1617 (510464)	Trimethylcyclohexyl Butylcarbamate	Ativo emagrecedor, redutor de medidas e anti celulite	0,200
2. Symtriol (399870)	Caprylyl Glycol, 1,2- Hexanediol, Methylbenzyl Alcohol	Blend Multifuncional com ação hidratante e antimicrobiana	1,000
3. Farnesol (130329)	Farnesol	Ativo Desodorante	0,300
4. Hydrolite 5 (616751)	Pentylene Glycol	Ingrediente Multifuncional	1,000
5. Fragância Fragance (918033)	Parfum	Fragância Symrise	0,500
Fase D			
1. AMP-Ultra PC 2000	Aminomethyl Propanol	Neutralizante	qs

Processo:

1. Sob agitação constante, pulverizar os itens da Fase A sobre a água e agitar por 15-20min.
2. Misturar os componentes da Fase B e agitar por 5 - 10 min.
3. Adicionar a Fase B sobre a Fase A, manter agitação por 10 min.
4. Adicionar os itens da Fase C e homogeneizar após cada adição.
5. Adicionar a Fase E para correção do pH entre 6,0 - 6,5.

Esta formulação é baseada em dados que acreditamos corretos. Recomendamos que qualquer sugestão antes de ser adotada seja testada quanto à estabilidade e a eficácia. As sugestões de uso não devem ser entendidas como estímulo a infração de qualquer legislação ou patente.